



Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica ed Epato-Bilio-Pancreatica

Responsabile: Dott. Adelmo Antonucci

Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Marcello Schiavo
MO1902221

PREPARAZIONE PER ECOENDOSCOPIA DELL'APPARATO DIGERENTE INFERIORE

1. IMPEGNATIVA

Per l'esecuzione dell'esame e, in base alle disposizioni amministrative della Regione, bisogna presentarsi muniti di impegnativa con le seguenti diciture, a seconda della procedura indicata:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente inferiore (retto,colon).

In caso di necessità di biopsia le diciture dell'impegnativa saranno da modificare come di seguito:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente inferiore (retto,colon) con biopsia.

In caso di necessità di ricovero, l'impegnativa per lo stesso sarà predisposta dal Medico Operatore o da altro Medico del Policlinico di Monza per i pazienti residenti in regione Lombardia.

Per i pazienti provenienti da altra Regione, l'impegnativa per ricovero (Day Surgery oppure Ordinario) deve essere predisposta dal Medico Curante



2. PREPARAZIONE

- *E' possibile comunque **assumere le terapie farmacologiche già in corso.***
- *I pazienti candidati a biopsia sotto guida ecoendoscopica in **terapia con antiaggreganti** (Aspirina, ticlopidina, Ibustrin, etc.) devono sospendere l'assunzione di questi farmaci almeno 7 gg prima dell'esame; chi è in terapia anticoagulante (Coumadin, Sintrom, Plavix, etc.) dovrà sospendere l'assunzione del farmaco, sostituendolo con iniezioni di eparina sottocute secondo i consigli del Centro TAO di riferimento o del proprio Specialista.*
- *Portare sempre con sé la **documentazione sanitaria** (radiografie del clisma opaco, tubo digerente, ecografie, referti endoscopici, terapie in corso, etc.).*
*E' necessario essere **accompagnati da una persona** in quanto potrebbe essere praticata un'iniezione sedativa*

Prodotto farmacologico occorrente

*Una confezione di **MOVIPREP** contiene 2 buste trasparenti; in ognuna di queste buste si trovano una busta grande A ed una bustina piccola B. Un litro di "soluzione" si prepara mescolando insieme una busta A e una bustina B in 1 litro di acqua fino a completo scioglimento (soluzione limpida). Ogni litro di soluzione deve essere bevuto nell'arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti). La preparazione comporta l'assunzione di 1 litro di soluzione seguito, **OBBLIGATORIAMENTE**, da 1 litro di altri liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla, brodo di dado).*

ATTENZIONE: MOVIPREP è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfatasi (favismo). Se risulta impossibile completare la preparazione, o in caso di controindicazione si prega di contattare il proprio Medico Curante o di telefonare ai seguenti numeri:

- **Servizio di Endoscopia Digestiva (Lun-Ven 08.30-16.30)**

- *Dr Davide Lochis*
- *Sig.ra Annalisa Barzaghi*

039/2810.309



Policlinico di Monza

Istituto ad Alta Specializzazione

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

- **Unità Operativa di Chirurgia Oncologica ed Epatobiliopancreatica**
- *Dr Marcello Schiavo*

039/2810.556



Due giorni prima dell'esame

- **Alimenti permessi** : uova, formaggio, pasta, semolino, pane bianco, burro o margarina, biscotti e fette biscottate non integrali e senza cereali, crackers non integrali, patate senza buccia, banane.
- Non sono permessi : carne, pesce, frutta, verdura, cereali in qualsiasi forma. Si raccomanda di **bere molti liquidi limpidi** (acqua, tè, camomilla, brodo di dado).
- In caso di stitichezza grave la dieta deve iniziare 3 giorni prima dell'esame.

Il giorno prima dell'esame

Esame al mattino (entro le ore 13:00)	Esame al pomeriggio
A colazione: caffè, tè, miele, zucchero, biscotti e fette biscottate (non integrali)	A colazione: caffè, tè, miele, zucchero, biscotti e fette biscottate (non integrali)
A pranzo: semolino o brodo di dado, pastina, uno yogurt (senza frutta in pezzi o cereali)	A pranzo: semolino o brodo di dado, pastina, uno yogurt (senza frutta in pezzi o cereali)
Dalle ore 18:30 alle ore 19:30: bere 1 litro di soluzione (un bicchiere ogni 10-15 minuti) e successivamente mezzo litro di liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla, brodo di dado)	A cena: solo brodo di dado o tè zuccherato
A cena: solo brodo di dado o tè zuccherato	



Il giorno dell'esame

Esame al mattino (entro le ore 13:00)	Esame al pomeriggio
<p>Al risveglio: presentarsi in Ospedale a digiuno. E' possibile eventualmente bere acqua non gassata, tè, camomilla con zucchero fino a 3 ore prima dell'esame.</p> <p>Controllare che le evacuazioni siano alla fine di liquido chiaro senza materiale fecale.</p> <p>Se così non fosse, eseguire un clistere Clisma Fleet o un clistere tradizionale a bassa pressione (sdraiati sul fianco sinistro e boccia del clistere a non più di 50 - 70 cm dal piano del letto)</p>	<p>Dalle ore 7:00 alle ore 8:00: bere 1 litro di soluzione (un bicchiere ogni 10-15 minuti) e successivamente mezzo litro di liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla).</p> <p>Non pranzare. E' possibile bere acqua, tè, camomilla con zucchero fino a 3 ore prima dell'esame.</p> <p>Controllare che le evacuazioni siano alla fine di liquido chiaro senza materiale fecale. Se così non fosse eseguire un clistere Clisma Fleet o un clistere tradizionale a bassa pressione (sdraiati sul fianco sinistro e boccia del clistere a non più di 50 - 70 cm dal piano del letto)</p>