MODULO DI PREPARAZIONE ESAME

TC COLON

Prodotto consigliato preparazione intestinale PLENVU® 1 L
PLENVU® è controindicato in caso di fenilchetonuria o favismo.

In caso di dubbio, consultare il proprio Curante.

Se si assumono farmaci per bocca poco prima o dopo PLENVU®, chiedere indicazioni al Curante: l'assorbimento dei medicinali potrebbe risultare ridotto.

La confezione contiene due dosi:
Dose 1: una bustina;
Dose 2: due bustine, A e B, da utilizzare insieme.

Giorno precedente

È consentita una cena a base di **brodo senza pastina**

Alle 19.30 sciogliere la Dose 1 in 500 ml d'acqua e mescolare fino a completo scioglimento. Raffreddare in frigorifero, se desiderato.
Alle 20.00, bere lentamente la soluzione, a piccoli sorsi, nell'arco di 30–40 minuti; può essere utile una cannuccia.
Nei 30 minuti successivi, bere almeno altri **500 ml di liquidi chiari**: acqua, tè, camomilla, succo di mela, bevande energetiche o gassate.

Giorno dell'esame

Alle 7.00, assumere la Dose 1:
lentamente, in 30–40 minuti, quindi bere almeno 500 ml di liquidi chiari nei 30 minuti successivi.
4 ore prima dell'esame:
bere un bicchiere d'acqua o tè e assumere **la Dose 2** lentamente, in 30–40 minuti, seguita da almeno altri 500 ml di liquidi chiari.
Interrompere tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame.

Giorno dell'esame

4 ore prima dell'esame assumere La Dose 2.
Sciogliere insieme le bustine A e B in 500 ml d'acqua. Prima di iniziare, bere un bicchiere d'acqua o tè.
Assumere quindi la Dose 2 lentamente, in 30–40 minuti, seguita da almeno altri 500 ml di liquidi chiari nei 30 minuti successivi.

In caso di nausea, rallentare l'assunzione e alternare PLENVU® con liquidi chiari. Interrompere tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame

Alimentazione

Il giorno precedente sono consentiti:

Colazione:
tè, fette biscottate, miele (non indicato nei diabetici).
Pranzo:
brodo o pastina in brodo, fette biscottate, miele, pollo o pesce lesso.
Cena:
brodo senza pastina.

Non assumere cibi solidi nelle 6 ore precedenti l'assunzione di PLENVU®.
I pazienti stitici devono assumere, salvo diversa indicazione medica, un lassativo la sera precedente, ad esempio due compresse di Dulcolax.

PRESENTARSI DUE ORE PRIMA DELL'APPUNTAMENTO