

POLICLINICO DI MONZA
Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione
Direttore Sanitario: Dr. Alfredo Lamastra
Via Carlo Amati, 111 – 20900 MONZA (MB) - Tel. 039.2810309 - fax 039.2810322

UNITA' FUNZIONALE DI VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA
Responsabile Dott. Michele Golia

PREPARAZIONE INTESTINALE PER LA COLONSCOPIA

PRODOTTO CONSIGLIATO: “PLENVU®”.

La confezione contiene 2 dosi: **DOSE 1 (1 sola bustina)** e **DOSE 2 (2 bustine: “A” e “B”)**. NON invertire la sequenza delle dosi.

CONTROINDICATO in chi è affetto da **FENILCHETONURIA** o **FAVISMO** (in caso di dubbio consultare il proprio Curante).

FARMACI

Consultare il proprio Curante se si devono assumere farmaci per bocca poco prima, o dopo l'assunzione di PLENVU, perché il loro assorbimento intestinale ne può risultare compromesso.

MODALITA' DI PREPARAZIONE E ASSUNZIONE

- **La preparazione intestinale (PLENVU®) comincia la sera del giorno che precede l'esame, a partire dalle ore 20.00 circa.**
- Prima di bere la soluzione è consentita una cena a base di brodo senza pasta.
- Poco prima della assunzione :
- sciogliere il contenuto della **DOSE 1** di PLENVU in mezzo litro di acqua fino a completo scioglimento (può richiedere qualche minuto); raffreddare in frigo, perché la soluzione è più gradevole se è fresca.
- sciogliere il contenuto della **DOSE 2** di PLENVU (Bustina A+ Bustina B insieme) in mezzo litro di acqua fino a completo scioglimento; raffreddare in frigo.
- Per ottenere una buona pulizia dell'intestino deve essere osservata la seguente modalità di assunzione in base all'orario in cui è stato programmato l'esame.

COLONSCOPIA FISSATA AL MATTINO ENTRO LE 14.00

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Alle **ore 20.00** bere la **DOSE 1** lentamente nell'arco di 30 minuti (un bicchiere ogni 10-15 minuti). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro **MEZZO LITRO** (500 ml) di liquidi chiari. E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

IL GIORNO DELL'ESAME

4 ore prima dell'esame bere la **DOSE 2** lentamente nell'arco di 30 minuti (un bicchiere ogni 10-15 minuti). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro **MEZZO LITRO** di liquidi chiari (acqua, the, camomilla, succo di mela, bevande energetiche tipo Gatorade, bevande gasate, caffè senza latte o panna). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'inizio dell'esame: interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

COLONSCOPIA FISSATA AL POMERIGGIO DOPO LE 14.00

IL GIORNO DELL'ESAME

POLICLINICO DI MONZA
Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione
Direttore Sanitario: Dr. Alfredo Lamastra
Via Carlo Amati, 111 – 20900 MONZA (MB) - Tel. 039.2810309 - fax 039.2810322

UNITA' FUNZIONALE DI VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA

Responsabile Dott. Michele Golia

1. Alle **ore 7.00** bere la **DOSE 1** lentamente nell'arco di 30 minuti (un bicchiere ogni 10-15 minuti). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro **MEZZO LITRO** (500 ml) di liquidi chiari. E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.
2. **4 ORE prima dell'esame** bere la **DOSE 2** lentamente nell'arco di 30 minuti (un bicchiere ogni 10-15 minuti). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro **MEZZO LITRO** di liquidi chiari. E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'inizio dell'esame: interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

NOTA BENE: I PAZIENTE STITICI devono assumere un lassativo la sera precedente l'esame (es: 2 compresse di Dulcolax).

ALIMENTAZIONE

COLAZIONE DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: the, fette biscottate, miele (controindicato nei diabetici).

PRANZO DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: brodo o pastina in brodo, fette biscottate, miele (controindicato nei diabetici), petto di pollo, pesce lesso.

CENA DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: brodo senza pastina

ALTRE AVVERTENZE

- Non mangiare cibi solidi nelle 6 ore che precedono l'assunzione di PLENVU.
- E' possibile bere liquidi chiari fino a 2 ore prima della colonscopia.



ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE DELLE DUE DOSI

PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi.

Dose 1: una bustina singola

Dose 2: due bustine diverse, A e B,

incollate tra di loro (da utilizzarsi insieme)



POLICLINICO DI MONZA
Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione
Direttore Sanitario: Dr. Alfredo Lamastra
Via Carlo Amati, 111 – 20900 MONZA (MB) - Tel. 039.2810309 - fax 039.2810322

UNITA' FUNZIONALE DI VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA
Responsabile Dott. Michele Golia

Come preparare PLENVU Dose 1 Aprire la scatola ed estrarre la bustina "Dose 1".

Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.

Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Come preparare PLENVU Dose 2

Estrarre la "Dose 2" dalla scatola; versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.

Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

